



## Instrucciones para la aplicación del Trimix Gel para el paciente

### MenMD

Contacte a un coordinador clínica de menMD si preguntas o inquietudes relacionadas con su medicamento o tratamieneto.

Por favor llame a  
(857) 233-5837



## Introducción

Su médico le ha recetado Erectogel o gel intrauretral. Esta terapia aumenta el flujo sanguíneo peniano con fines de rehabilitación o para el tratamiento de la disfunción eréctil ( ED ). Este folleto le explicará lo que debe saber sobre el uso de Erectogel o gel intrauretral.

## Incluido en su envío

- Inyectadoras precargadas con Erectogel o gel intrauretral (sin agujas).  
El número de inyectadoras precargadas con gel dependerá de la cantidad que su compañía de seguros apruebe o de la cantidad comprada por usted.
- Paquetes de hielo ( para mantener la medicación fresca durante el transporte ).
- Información sobre su coordinador clínico de MenMD.  
Puede llamar a su coordinador clínico con cualquier pregunta o preocupación referente a su medicamento.

## Almacenamiento de Erectogel o gel intrauretral

Su medicamento fue enviado por correo con hielo durante la noche. El producto puede permanecer sin refrigeración durante 48-72 horas. Por lo tanto, no se preocupe si el hielo se derrite.

Mantenga el medicamento refrigerado.

No utilice el medicamento después de su fecha de vencimiento.

Si desea otra prescripción, por favor llámenos al ( 857 ) 233-5837 .

## Dosificación y uso del Erectogel o gel intrauretral

### Cuándo utilizar

Puede utilizar el gel una vez cada 24 horas o según lo recomiende su doctor. Si usa el gel para rehabilitación peniana, la estimulación sexual no es necesaria y se recomienda utilizar el gel a diario.


La mayoría de los hombres experimentan los efectos del flujo sanguíneo de 5 a 15 minutos después de la aplicación del gel.

### Dosificación


La dosis recomendada por su médico esta impresa en la etiqueta de la farmacia. Se recomienda empezar con una dosis baja y aumentar la dosis poco a poco hasta obtener el efecto deseado. Muchos hombres experimentan en privado con la dosis antes de involucrar a su pareja.

Su coordinador clínico puede ayudarlo a usar el gel correctamente y a conseguir la dosis apropiada.


**Figura 1: Inyectadora**



**Figura 2. Preparación de la inyectadora**



**Figura 3: Administración intrauretral**



**Aplicación de Erectogel o gel intrauretral I ( Cómo utilizar ):**

1. Retire la tapa reutilizable de la inyectadora y coloque la punta de la inyectadora en la apertura de la uretra peniana.
2. Inserte o introduzca suavemente la punta cónica de la inyectadora en la uretra ( Figura 2 ).
3. Presionar lentamente el émbolo para administrar el gel en la uretra.  
**NOTA:** Para maximizar el efecto del gel, evite que el gel salga fuera de la uretra. Aprete la punta del pene con el pulgar y el dedo índice para crear un sello hermético alrededor del pene y la inyectadora mientras presiona o deprime el émbolo.
4. Presione el émbolo para administrar la dosis recomendada ( Figura 3 ):  
**NOTA:** Observe y memorice la cantidad de gel que hay en la inyectadora de manera de administrar la dosis deseada. Por ejemplo, si su dosis es de 0,25 ml , y la inyectadora tiene un 1,0 ml, presione el émbolo de 1,0 ml a 0,75 ml.
5. Retire la inyectadora de la abertura de la uretra y cierre la uretra apretando la punta del pene entre el pulgar y el dedo índice con el objeto de crear un sello hermético que evite la salida del gel. Trate de distribuir el medicamento a lo largo de la uretra comprimiendo en forma secuencial el pene con una mano mientras la otra mano mantiene la abertura de la uretra cerrada. Al distribuir el gel a lo largo de la uretra, la absorción del medicamento aumentará mejorando su efectividad. Mantenga presionado el pene por 2-3 minutos mientras mantiene la abertura de la uretra cerrada.
6. Tape la inyectadora y guárdela en la nevera para la próxima vez.


**Resultados:**

- Notara el aumento de flujo sanguíneo peniano entre 5 y 15 minutos.
- Si su médico le recetó Erectogel o gel intrauretral para ayudar con la rehabilitación peniana, el objetivo de este tratamiento es aumentar la oxigenación peniana y no inducir una erección para la actividad sexual.
- Si usted no experimenta los resultados deseados después de la administración del gel, espere 24 horas antes de volver a intentarlo. No use las inyecciones intracavernosas al mismo tiempo que el gel.

Llame a su coordinador clínico en MenMD al 857-233-5837, ellos trabajan con su médico para proporcionarle soluciones a sus de problemas. Nuestra experiencia es que los mejores resultados se consiguen cuando los coordinadores clínicos trabajan con usted.

**Escala de Rigidez Peniana:**

Un coordinador clínico trabajará con usted después de cada aplicación de gel hasta lograr una erección satisfactoria.



Utilice la tabla anexa para documentar sus experiencias y poder discutir su caso con el coordinador clínico de menMD:

Fecha									
Volumen administrado (mL)									
Duración de la erección									
Escala de Rigidez Peniana									



Para servicio inmediato, llame al: **(857) 233-5837**  
o correo electrónico: **expert@menMD.com**

Para obtener más información, visite:  
**www.menMD.com**

**Recordatorios importantes:**

Ardor o dolor peniano después de la aplicación del gel es una reacción adversa bastante común y que se resolverá espontáneamente. No piense que usted se ha hecho daño durante la aplicación del gel si experimenta dolor or ardor peniano.

No utilice el gel de trimix si su pareja esta embarazada a menos que use condón que evite la transferencia de gel a su pareja.

No exceda la dosis recomendada, ya que puede causar una erección dolorosa conocida como priapismo. Las erecciones prolongadas (> 4 horas) pueden causar daño peniano y disfunción eréctil permanente. Si usted experimenta una erección prolongada, no espere, vaya de inmediato a la oficina de su doctor o a la emergencia.

No tome Viagra , Levitra , Staxyn , Cialis el mismo día en que usted está planeando usar **Erectogel o gel intrauretral** a menos que se lo indique su médico.

Si usted experimenta dolor persistente , hinchazón , o fiebre , es posible que tenga una infección. Por favor, póngase en contacto con su médico o vaya a la emergencia de inmediato .